



- **Primo-infection** : symptômes d'une maladie virale bénigne (fièvre, gonflement des ganglions). La séropositivité est détectable quelques semaines après contamination.
- **Phase asymptomatique** : l'individu infecté est séropositif pour le VIH, mais il ne présente aucun symptôme.
- **Phase de sida déclaré** : après une période de durée variable de la phase asymptomatique, et en l'absence de traitement, les lymphocytes (B et T) sont détruits par le virus : l'individu devient immunodéficient. Le sida (syndrome d'immunodéficience acquise) est déclaré quand apparaissent des maladies opportunistes. Les symptômes sont : perte de poids importante, infections graves par divers micro-organismes, cancers. L'individu meurt le plus souvent d'une infection généralisée.

Doc 1. Les différentes phases de la maladie

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA MALADIE



doc.2 L'infection par le virus du SIDA



Doc 3 : Les différentes phases de l'infection par le VIH en l'absence de traitement.

Lorsque le nombre de LT_4 est trop faible, des maladies profitent de l'affaiblissement des défenses pour s'installer : ce sont des maladies opportunistes*. Une personne atteinte du SIDA meurt des suites de maladies opportunistes*, et le plus souvent d'infections généralisées.