

TRAITEMENTS ET DÉPISTAGE



ALS

PRÉVENTION

SOUTIEN

MÉDIATION

INFOS

FORMATION

RESSOURCES



TRAITEMENTS CONTRE LE VIH SIDA

> Il n'existe aucun traitement pour guérir l'infection au VIH

Une personne séropositive est séropositive à vie. Les différents traitements ont pour rôle de bloquer l'évolution du virus dans l'organisme et de maintenir l'équilibre entre la présence du virus dans le corps et le système de défense de l'organisme.

Ces traitements ne sont pas anodins ; ils peuvent provoquer des effets secondaires lourds tels que nausée, diarrhée, grande fatigue... Le commencement d'un traitement est lié à l'état du système immunitaire infecté et est donc adapté à chaque personne. Les traitements doivent être réajustés régulièrement par un médecin en fonction de l'évolution de l'état du patient.


Document 1 : absence de traitement

On ne guérit pas du SIDA

Les médicaments font remonter le taux de lymphocytes T4 et diminuer la présence du virus dans l'organisme en freinant sa multiplication. Ils permettent de vivre avec le virus mais ne l'éliminent jamais complètement.

Les traitements présentent encore d'importants effets secondaires et restent coûteux, ce qui les rend inaccessibles à de nombreux malades des pays pauvres.

Doc 2. Aucun traitement actuel contre le SIDA



doc 3. La recherche d'un vaccin contre le VIH



Le test Elisa est un test utilisé pour détecter la présence d'anticorps dans le sang dont des anticorps anti-VIH. Si des anticorps sont présents, la personne a été contaminée. Elle est dite séropositive pour le sida. Lors du test, l'apparition d'une coloration révèle la présence d'anticorps anti-VIH.

La séropositivité peut apparaître dès le quinzième jour après une contamination. En cas de résultat négatif chez une personne susceptible d'avoir été au contact du virus, ce n'est que trois mois plus tard qu'un nouveau test déterminera avec certitude une contamination éventuelle.

doc 4. un test de séropositivité.

QUEL EST LE COÛT D'UN TEST DE DÉPISTAGE?

Un test de dépistage du VIH est gratuit s'il est réalisé dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Un test peut également être réalisé dans un laboratoire d'analyses médicales. Dans ce cas, il faut se munir d'une prescription médicale. [...]

COMMENT FAIRE UN TEST DU VIH ?

Le test de dépistage est un examen biologique qui peut être prescrit par tout médecin, notamment le/la médecin traitant. Il existe également dans tous les départements français des lieux dédiés, les CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic), qui sont également habilités à effectuer le dépistage des hépatites [...]

DÉPISTAGE DU VIH GRATUIT : AU LABO SANS ORDO

A partir de lundi 1er juillet 2020, il est possible de réaliser gratuitement, sans ordonnance, ni rendez-vous, un dépistage du VIH, dans certains laboratoires de Paris et des Alpes Maritimes. Cette opération #VIHTEST devrait durer un an et sera entièrement financée par l'Assurance Maladie. [...]

LES TESTS SONT-ILS VRAIMENT FIABLES ?

Les tests du sida sont toujours réalisés selon des règles très strictes. Le laboratoire réalise un test ELISA combiné qui consiste en une recherche des anticorps produits en présence du VIH, ainsi qu'une recherche d'une particule du virus, l'antigène p24, détectable plus tôt que les anticorps. [...]

QUEL EST LE DÉLAI DE FIABILITÉ D'UN TEST ?

Le délai de fiabilité d'un test de dépistage du VIH est de 6 semaines entre le moment où on a pris un risque et celui où on fait le test. Attention : ce délai est le résultat d'un consensus médical et non d'un texte à valeur juridique. [...]

LE DÉPISTAGE EST-IL OBLIGATOIRE ?

Le test est obligatoire uniquement en cas de don de sang, de sperme, d'organes ou de lait. Il est proposé systématiquement aux femmes enceintes et avant un mariage. [...]

LES AUTOTESTS VIH SONT LÀ !

Autotest VIH ® présenté ici, est un test permettant de détecter dans le sang humain les anticorps produits après une infection par le VIH. Le prélèvement, la lecture et l'interprétation des résultats sont réalisés par la personne elle-même, par exemple à domicile. [...]

LE DÉPISTAGE EST-IL OBLIGATOIRE ?

Le test est obligatoire uniquement en cas de don de sang, de sperme, d'organes ou de lait. Il est proposé systématiquement aux femmes enceintes et avant un mariage. [...]

COMBIEN DE TEMPS POUR AVOIR LES RÉSULTATS D'UN TEST ?

Le délai pour la remise des résultats d'un test de dépistage varie de moins d'une heure à une semaine environ, selon le test (TROD, autotest ou prise de sang) utilisé et selon le lieu où il est fait (laboratoire d'analyse, CeGIDD) [...]

Doc 5. Quelques informations sur le dépistage



Solidarité SIDA
1000 DÉFIÉS CONTRE LE SIDA

HOME NEWS L'ASSOCIATION MISSIONS URGENCE AFRIQUE INFOS SIDA PAS

État des lieux C'est quoi ? **Dépister**

- Parler de sa prise de risque >
- Le traitement post-exposition >
- Le test** v
- Pourquoi faire un test ? >
- Quand faire le test ? >
- Où faire le test ? >
- Le résultat >

Cliquez ici pour trouver où se trouve le CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) le plus proche de chez vous.

En savoir plus :
Contacter Sida Info Service
www.sida-info-service.org
0800 840 800 (appel anonyme et gratuit)

Le test

Seul les tests permettent de détecter la présence du virus dans l'organisme. En France, cette démarche reste libre et volontaire.

Le test VIH n'est pas une obligation : Il ne doit pas être imposé (par un employeur ou tout autre personne) et ne doit pas être pratiqué à l'insu ou sans le consentement des personnes concernées.

Le test VIH ne peut être utilisé comme un moyen d'identification ou de répression : par exemple pour exclure une personne de son travail ou pour entraver sa libre circulation.

Le test VIH ne se substitue pas à un moyen de protection : si vous avez une sexualité non protégée ou si vous partagez du matériel d'injection, le VIH peut se transmettre à la vingtème, à la centième comme à la première prise de risque, même si jusqu'ici les tests se sont tous révélés négatifs.

Il existe trois types de test:

- Le test sanguin (Centre de dépistage, hôpital, laboratoire) : par prise de sang il vous donne votre statut sérologique d'il y a 6 semaines. Remise des résultats quelques jours après la prise de sang.
- Le Trod (test rapide à orientation diagnostique) : il peut être réalisé en centre de dépistage ou par des associatifs qui prennent simplement une petite goutte de sang au bout des doigts. Il vous donnent votre statut sérologique d'il y a 3 mois au bout d'une dizaine de minutes. (En cas, de test positif ce test doit être confirmé et validé par un test sanguin).
- L'autotest (en vente autour de 28 euros en pharmacie ou sur le site internet de l'ordre des pharmaciens) : test à réaliser soit même en prenant une petite goutte de sang au bout des doigts. Il vous donnent votre statut sérologique d'il y a 3 mois. (En cas, de test positif ce test doit être confirmé et validé par un test sanguin).

doc. 6. Les différents tests de dépistage

