

Compte-rendu de l'interview réalisée par Antony et Lia, élèves de 3^e, à Paris, Janvier 2023.

1) Que signifie le sigle UNICEF ? United Nations International Children's Emergency Fund = Fonds des Nations Unies pour l'enfance.

2) Quand cette agence a-t-elle été créé ? En 1946.

3) Quel est son rôle ?

Elle est chargée de défendre les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement, dans le monde entier.

4) Quels sont les 7 domaines d'action de l'UNICEF à travers le Monde ?

Santé, VIH/sida, eau/hygiène/assainissement, nutrition, éducation/égalité, protection, et inclusion sociale.

5) Quels sont leurs domaines d'intervention en termes de VIH/SIDA ?

Prévention de la transmission de la mère à l'enfant, soins pédiatriques, adolescents...

6) En Zambie, quelle est la prévalence du SIDA ? Quelle partie de la population a le taux de prévalence le plus élevé ?

Ce pays détient en effet l'un des taux de prévalence les plus élevés au monde (13,5%), avec une population la plus touchée les femmes enceintes : 16,4% de prévalence...

7) A quels moments la transmission du VIH de la mère à l'enfant a-t-elle lieu ?

- accouchement
- allaitement

8) Quand une mère n'est pas prise en charge, quel est le pourcentage de risque qu'elle contamine son enfant ?

Lorsqu'une mère séropositive n'est pas prise en charge, elle a jusqu'à 40% de risques de contaminer son enfant.

9) Quand une mère est prise en charge, quel est le pourcentage de risque qu'elle contamine son enfant ?

Avec prise en charge spécifique, le risque tombe à moins de 5% ! Par ailleurs, parmi les nouveau-nés déjà infectés (ils seraient 110 000 aujourd'hui en Zambie), 1/3 mourront avant leur premier anniversaire, 50% avant leurs 2 ans, et 75% ne fêteront jamais leurs 5 ans... C'est pourquoi la prise en charge de la maman, et du bébé, est indispensable à leur survie à tous les deux !

10) Comment réduire la transmission du VIH ?

Il faut dépister les enfants, leur mère et les adolescents et de leur fournir un traitement.

11) Comment s'appelle mis en place en Zambie par l'UNICEF ?

C'est un programme de prévention de la transmission du virus du VIH/Sida de la mère à l'enfant (PTME) et de prise en charge des nouveaux nés séropositifs.

12) Quel est le pourcentage de femmes enceinte recevant des soins antiviraux en Zambie depuis la mise en place de ce programme ?

Il est passée de 44% seulement, à 85% en 2012.

13) Développer les 4 exemples concrets indiquant comment l'UNICEF intervient :

- Achat et mise en place de 5 machines d'évaluation de la charge virale (très chères mais cruciales, elles permettent de définir le niveau de contamination du patient, d'aider à choisir les traitements adaptés, etc.)
- Fourniture de matériel : 60 hémoglobinomètres, 400 kits de dépistage VIH, 2000 kits pour femmes enceintes, 300 kits sages-femmes, 20 kits

chirurgicaux obstétriques... Ainsi que 24 motos pour que les agents de santé puissent se déplacer auprès des patients.

- Séances de sensibilisation auprès des chefs et agents de santé (qui peuvent désormais eux-mêmes sensibiliser chacun environ 200 membres de la communauté), ainsi qu'auprès des leaders communautaires traditionnels ; tous se sont engagés à inciter les parents (pères inclus !) à se rendre aux consultations prénatales, à ne plus accoucher seuls mais assistés médicalement, etc.
- Formation d'agents de santé et d'agents communautaires au dépistage, à la PTME, à la prise en charge des bébés séropositifs, et plus largement à la prise en charge des tout-petits (malnutrition...)

14) Combien d'enfants et d'adolescents sont infectés par le VIH en 2020 ?

En 2020, 300 000 enfants et adolescents auraient été infectés, soit un enfant infecté par le VIH toutes les deux minutes. La même année, 120 000 enfants et adolescents sont décédés de causes liées au sida, soit un enfant toutes les cinq minutes.

15) Quels sont les 3 axes d'action de l'UNICEF pour éradiquer la transmission du VIH ?

- Transmission de la mère à l'enfant : Les femmes séropositives doivent avoir accès aux services nécessaires pour rester en vie et prévenir la transmission du VIH à leur bébé durant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.
- Traitement et soins pédiatriques : Sans traitement, la moitié des bébés séropositifs mourront avant 2 ans. Le dépistage précoce des nourrissons et la mise en place d'un traitement immédiat constituent une priorité absolue pour les bébés exposés au VIH.
- Nouvelles infections au VIH chez les adolescents : La prévention, l'auto-dépistage du VIH, des services visant à améliorer l'accès au traitement et aux soins.